

FLERE
DYREBARE
ØYEBLIKK.



Informasjonsfolder til hundeeiere om
hjertesvikt hos hund og behandling
med VETMEDIN® VET (pimobendan).



**Boehringer
Ingelheim**
Continuous Care

FREMTIDEN BEGYNNER MED ØKT KUNNSKAP.



Hjertesvikt behøver ikke hindre hunden din i å nyte livet.

Hunden din har fått diagnosen hjertesvikt. Selv om dette er en alvorlig tilstand for hunder, trenger det ikke hindre deg og hunden din i å leve et fullverdig liv. Veterinæren din har foreskrevet VETMEDIN VET, et legemiddel som kan bidra til å forlenge livet til hunden din, og til å forbedre livskvaliteten.

Denne brosjyren inneholder generell informasjon om stell av en hund med hjertefeil. Den erstatter imidlertid ikke de anbefalinger du får fra veterinæren din.

Hjertesvikt påvirker hjertets evne til å pumpe blod rundt i kroppen. VETMEDIN VET hjelper dette systemet på to måter:

- ♡ VETMEDIN VET styrker hjertets sammen- trekninger og letter transporten av blod inn i og ut av hjertet, og hjelper dermed hjertet å pumpe mer effektivt.
- ♡ VETMEDIN VET utvider blodkarene som transporterer blod til og fra hjertet, og reduserer dermed belastningen på hjertet.

Det er viktig å vite at det ikke finnes noe middel mot hjertesvikt, men hvis du følger veterinærens anvisninger nøye, og gir den behandlingen som kreves, kan tilstanden holdes under kontroll.

BEHANDLING SOM UTVIDER MULIGHETENE.

VETMEDIN VET har en viktig plass i behandlingen av hjertesvikt.

Den medisinske behandlingen av hjertesvikt kan bestå av ett eller en kombinasjon av følgende legemidler:

DIURETIKA

Når hjertet ikke har tilstrekkelig pumpeevne, kan det føre til et overskudd av væske i kroppen. Diuretika er vanddrivende midler som reduserer dette væskeoverskuddet.

VETMEDIN VET

VETMEDIN VET er en medisin som utvider innsnevrede blodkar som transporterer blod til og fra hjertet. Dette minsker belastningen på hjertet. VETMEDIN VET hjelper også hjertet å pumpe mer effektivt.

ACE-HEMMERE

ACE-hemmere er legemidler som åpner opp innsnevrede blodkar og dermed minsker belastningen på hjertet.

Det finnes også andre legemidler som forbedrer hjerteslagenes styrke, takt eller rytme hos hunden din.



Behandlingen må tilpasses hver enkelt hund.

Den behandlingen veterinæren din foreslår, er basert på behovene hunden din har og hvilket stadium hjertesykdommen er på.

Veterinæren din kan også bli nødt til å justere behandlingen ettersom sykdommen utvikler seg.

OPPLEV FORSKJELLEN.

Se effekten av VETMEDIN VET.

VETMEDIN VET kan hjelpe hunden din å bli mer aktiv og føle seg bedre. Hold øye med hunden din under de daglige aktivitetene. Legg spesielt merke til adferdsendringer, appetitt og bevegelighet.

Du bør se forbedringer med tanke på de vanlige symptomene på hjertesvikt:

MINDRE HOSTE

MER ENERGI

BEDRE APPETITT

MINDRE PROBLEMER MED PUSTING ELLER BESVIMELSESANFALL

Doseringsanvisninger for VETMEDIN VET

VETMEDIN VET finnes som kapsler og tyggetabletter. Doseringen er basert på hundens vekt. Den anbefalte VETMEDIN VET-dosen skal gis en time før måltider, morgen og kveld. Dette skyldes at hundematen kan forstyrre opptaket av VETMEDIN VET i magen og gjøre behandlingen mindre effektiv.

Du kan se frem til mer kvalitetstid med hunden din.

VETMEDIN VET er bare en del, men en meget viktig del, av behandlingen av hjertefeilen til hunden din. I tillegg til VETMEDIN VET kan veterinæren din foreskrive andre typer behandling og anbefale forandringer i kosthold og mosjon.

Regelmessige kontroller hos veterinæren er en viktig del av den løpende behandlingen av hjertesvikt hos hunden din.

VANLIGE SPØRSMÅL OG SVAR.



Hvor lenge kommer hunden min til å trenge behandling?

Det finnes intet botemiddel mot hjertefeil, men medisinsk behandling kan forlenge livet og forbedre livskvaliteten til hunden din. Sykdommen vil imidlertid utvikle seg etter hvert. Behandlingen med VETMEDIN VET bør opprettholdes så lenge hunden din reagerer positivt på behandlingen.

Hvor lang tid tar det før hunden min blir bedre ved oppstart av behandlingen med VETMEDIN VET?

Etter at hunden din har begynt behandlingen med VETMEDIN VET, bør du se en forbedring i løpet av et par døgn. Forbedringen kan så fortsette de påfølgende ukene.

Må jeg gå til veterinæren for regelmessig kontroll?

Som ved all langtidsbehandling må du gå jevnlig til veterinæren. I begynnelsen kan du være nødt til å gå ofte, men når hundens hjertetilstand har stabilisert seg, kan du la det gå lengre tid mellom hver gang. Hvis tilstanden til hunden din forverres, kan det bli nødvendig å øke antallet besøk igjen.

Kan jeg mosjonere hunden min?

Det er meget viktig å snakke med veterinæren om hvilken type mosjon og trening som passer for hunden din. Enkelte hunder trenger absolutt hvile på grunn av hjertesykdommen sin.

vet²edin®

Vetmedin vet. «Boehringer Ingelheim Danmark A/S»

ATCvet-nr.: QC01C E90

KAPSLER, hard 5 mg: Hver kapsel inneh.: Pimobendan 5 mg, hjelpestoffer. Farvestoff: Paraoransje (E 110), titandioksid (E 171).

TYGGETABLETTER, 1,25 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Pimobendan 1,25mg resp. 5 mg, hjelpestoffer. Med delestrek.

Egenskaper: *Klassifisering:* Inotrop substans med potente vasodilaterende egenskaper. *Virningsmekanisme:* Virker stimulerende på myokardet, dels ved å øke myokardets kalsiumfølsomhet og dels ved hemming av fosfodiesteraseaktiviteten (type III). *Absorpsjon:* Den absolutte biotilgjengelighet er ca. 60–63%. Maks. serumkonsentrasjon nås etter ca. 1 time. Biotilgjengeligheten reduseres vesentlig hvis pimobendan gis samtidig med eller kort tid etter fôrintak. *Fordeling:* Distribusjonsvolumet er 2,6 liter/kg. *Proteinbinding:* 93%. *Halveringstid:* For pimobendan ca. 0,4 timer. Den aktive metabolitten ca. 2 timer. *Clearance:* Ca. 90 ml/minutt/kg. *Metabolisme:* En aktiv metabolitt dannes ved oksidativ demetylering. *Utskillelse:* Hovedsakelig via fæces. **Indikasjoner:** Behandling av hund med kongestiv hjereteinsuffisiens som skyldes dilatert kardiomyopati eller valvulær insuffisiens (mitral og/eller trikuspidal tilbakestrømning). **Kontraindikasjoner:** Hypertrofisk kardiomyopati, kliniske tilstander der en økning i minuttvolumet ikke er mulig pga. funksjonelle eller anatomiske årsaker (f.eks. aortastenose). **Bivirkninger:** Moderat positiv kronotrop effekt og oppkast kan i sjeldne tilfeller forekomme. Disse bivirkningene er doseavhengige og kan unngås ved dosereduksjon. Enkelte tilfeller er det observert symptomer på manglende koordinasjon, lett eksitert adferd eller latargi, nedsatt appetitt, forbigående utilpasshet samt mild forbigående diaré. Symptomene er særlig sett ved oppstart av behandling. **Interaksjoner:** Samtidig bruk av verapamil og propranolol svekker virkningen av pimobendan. **Drektighet/Laktasjon:** Det er ikke gjort undersøkelser der preparatet er brukt til drektige eller lakterende tisper, og preparatet anses ikke relevant for avlstisper. **Dosering:** 0,2–0,6 mg/kg kroppsvekt fordelt på 2 daglige doser. Dosen gis med 12 timers mellomrom ca. 1 time før fôring. Preparatet kan kombineres med diuretisk behandling som f.eks. furosemid. **Administrasjon:** Kapslene må svelges hele. Tyggetablettene kan deles. **Overdosering/Forgiftning:** I tilfelle av overdosering bør symptomatisk behandling iverksettes. **Oppbevaring og holdbarhet:** **Kapsler:** Skal oppbevares < 25°C. **Pakninger: 5 mg:** 100 stk. **Tyggetabletter:** Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. **Pakninger: 1,25 mg:** 50 stk. **5 mg:** 50 stk. Reseptbelagt: Gruppe C



**Boehringer
Ingelheim**
Continuous Care

Boehringer Ingelheim Vetmedica
Postboks 155 - 1376 Billingstad
Tlf. 66 85 05 70. Fax. 66 85 05 72
www.bivet.nu/no